



## Casus mevrouw Klasinga

De casus staat ook op de Canvas course PO jaar 3.

Mevrouw Klasinga, 83 jaar, is opgenomen op de afdeling traumatologie vanwege een heupfractuur na een val in huis op weg naar het toilet. Zij heeft hierbij haar rechterheup gebroken en kon niet meer opstaan. Bij opname zag de arts een oudere mevrouw met een opvallend laag gewicht. Uit nadere diagnostiek bleek een proximale femurfractuur rechts met dislocatie. Mevrouw is diezelfde dag geopereerd en heeft een kop-hals-prothese gekregen. Postoperatief ontwikkelde mevrouw een delier. Verder is sprake van veel pijn aan de geopereerde heup waarvoor zij pijnmedicatie en een slaapmiddel (temazepam) krijgt. Mevrouw wil graag weer terug naar haar eigen huis. Inmiddels krijgt mevrouw looptraining onder begeleiding van een therapeut en is een afbouwschema voor de medicatie gestart. De looptraining vlot niet erg, mevrouw is angstig en onzeker.

Mevrouw is weduwe en woont zelfstandig. Enkele maanden geleden is haar zoon (54 jaar) overleden aan een coloncarcinoom. Mevrouw heeft naast de partner van haar zoon geen andere kinderen, wel een nicht die op ruim 40 kilometer afstand woont. Het contact met de schoondochter is slecht. De nicht heeft een gezin met opgroeiende kinderen, beide partners werken. De buurman van mevrouw zorgt wekelijks voor de boodschappen.

### Medische gegevens bij opname

Mw. is suf, maar wel aanspreekbaar. Ze lijkt gedesoriënteerd in plaats en tijd.

Mw. kan zich niet herinneren hoe zij is gevallen; volgens de ambulance medewerker heeft de buurman mevrouw gevonden. Het is niet bekend hoelang zij al op de grond lag.

Een hetero-anamnese is niet afgenomen (buurman was niet aanwezig).

### Voorgeschiede

nis Chronische

hypertensie

Coxartrose beiderzijds (Kellgren and Lawrence score graad 3)

### Tijdlijn

Dag 1. 16 maart 2020 – Opname en operatie

Dag 4. 19 maart 2020 – Bepalen beleid na opname

### Aanvullende informatie uit patiëntendossier

#### Actueel Medicatieoverzicht bij opname

- captopril/hydrochloorthiazide  
50/25 mg Indicatie: chronische  
hypertensie Dosering: 's  
morgens 1 tablet
- clomipramine 25 mg  
Indicatie: depressieve  
episode Dosering: 3x

- daags 2 tabletten
- ibuprofen 400 mg  
Indicatie: pijn door degeneratieve gewrichtsaandoening  
Dosering: 3x per dag 1 tablet

#### Diagnostiek bij opname

Lichamelijk onderzoek: temp. 36.6 Celsius, RR 150/90 mmHg, dehydratie, BMI 19, pols 100/min  
Lab waarden: Hb 8.2, Ht 0.43, ery 4.6, leuco 9.8, MCV 84, pO2 98, pCO2 41, O2 saturatie 0.97, pH 7.40

Pijnscore NRS 5-6

Algemene lichamelijke conditie op basis van patiënt dossier HA: ASA classificatie 2-3

Mobiliteitsscore volgens Parker en Palmer: onduidelijk

Röntgen: AP bekkenfoto met heupfractuur rechts resp. Axiale foto van de rechter heup met fractuur

#### Medicatie gestart tijdens opname

- temazepam 20 mg Indicatie: slaapstoornis  
Dosering: ,1 tablet voor slapen gaan Stopdatum: 21 maart 2020
- paracetamol 500 mg Indicatie: acute pijn Dosering: elke 6 uur 1 zetpil

#### **Medische gegevens op dag 4**

##### Diagnostiek

Gering hematoom rond operatiewond, geen decubitusverschijnselen Functioneren vóór de fractuur: Barthel Index 15-17 (informatie mantelzorg) Cognitief functioneren: MMSE-score 25

#### Actueel Medicatieoverzicht, op dag 4 na opname

- cefaclor 250 mg en oxycodon 5 mg inmiddels gestopt
- dalteparine  
Indicatie: preventie trombo-embolie  
Dosering: 5000 IE per dag via subcutane toediening
- haloperidol 2 mg/ml Indicatie: acute verwardheid  
Dosering: 2x per dag 1 druppel
- captopril/hydrochloorthiazide 50/25 mg Indicatie: chronische hypertensie Dosering: 's morgens 1 tablet
- clomipramine 25 mg  
Indicatie: depressieve episode  
Dosering: 2x per dag 2 tabletten
- temazepam 10 mg Indicatie: slaapstoornis  
Dosering: 1 tablet innemen voor slapen gaan Stopdatum: 21 maart 2020
- paracetamol 500 mg
- Indicatie: acute pijn Dosering: elke 4 uur 1 tablet